

Pomocný prostředek na ochranu rostlin

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Obchodní název pomocného prostředku: **INPORO PS proti mšicím a sviluškám RTU**

Pomocný prostředek určený k podpoře zdravotního stavu, k ošetření okrasných rostlin proti sviluškám, puklicím, štítkám a mšicím.

Typ pomocného prostředku a typ působení pomocného prostředku:

Formulační úprava: kapalina k aplikaci bez ředění

Typ působení pomocného prostředku: podpora zdravotního stavu

Kategorie uživatelů:

NEPROFESIONÁLNÍ UŽIVATEL

Název a množství účinné složky:

dokusát sodný 3,3 g/l (0,33 % hm.)

Označení pomocného prostředku:

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Držitel povolení: AgroBio Opava, s.r.o. Mostní 41/1 Skrochovice, 747 71 Brumovice

Osoba odpovědná za konečné balení a označení pomocného prostředku na ochranu rostlin na trhu:

AgroBio Opava, s.r.o. Mostní 41/1 Skrochovice, 747 71 Brumovice

Evidenční číslo pomocného prostředku: 1811-2C

Číslo šarže / datum výroby formulace: uvedeno na obalu

Doba použitelnosti nebo Datum expirace: 2 roky od data výroba; teplota skladování +5°C až +30.°C

Množství pomocného prostředku v obalu: HDPE láhev s rozprašovačem a pomocným prostředkem v množství 250 ml, 500 ml a 750 ml.

Návod k použití - Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL (dny)	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL 4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
okrasné rostliny	podpora zdravotního stavu	– podle návodu na použití	-	2) mšice, svilušky, puklice, štítky 4) do počátku sknutí

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

Plodina, oblast použití	Způsob aplikace	Interval mezi aplikacemi
okrasné rostliny	postřik	7 – 14 dnů

Před ošetřením ověřte citlivost na menším počtu rostlin / menší ploše.

Upřesnění použití:

Pomocný prostředek by měl být aplikován po zjištění výskytu prvních škodlivých organismů. Aplikace by se měla provádět brzy ráno nebo pozdě večer, tj. před nebo po skončení letu včel, nejlépe při nízké vlhkosti vzduchu (bez deště), aby pomocný prostředek na rostlině rychle zaschl. Aplikujte na celou rostlinu ze vzdálenosti 30 cm tak, aby byla vlhká, ale netvořily se kapky. Opatrně zakryjte spodní část listu. Nepoužívejte pomocný prostředek na okvětní lístky. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škodlivým organismem.

Další omezení:

Neznečišťujte vody pomocným prostředkem nebo jeho obalem. Postřik provádějte vždy tak, aby nedošlo k zasažení dalších osob. Vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí postřiku. Po práci si umyjte

ruce a postříkané části těla. Při práci nejzte, nepijte a nekuřte. Při používání pomocného prostředku na ochranu rostlin nepoužívejte kontaktní čočky.

Osobní ochranné pracovní prostředky:

Ochrana dýchacích orgánů: není nutná
Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice
Ochrana očí a obličeje: není nutná
Ochrana těla: není nutná
Dodatečná ochrana hlavy: není nutná
Dodatečná ochrana nohou: není nutná

Společný údaj k OOPP: Poškozené OOPP (např. protřzené rukavice) je nutné urychleně vyměnit.

Informace o první pomoci:

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uveďte lékaře.

První pomoc při nadýchání: Přerušete práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.

První pomoc při zasažení kůže: Umyjte zasaženou kůži vodou a mýdlem.

První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím vlahe čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazené, a pokud je lze snadno vyjmout. Zasažené kontaktní čočky je třeba je zlikvidovat.

První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa čistou vodou.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o pomocném prostředku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování:

Pomocný prostředek skladujte v uzavřených neporušených originálních obalech, v suchých, chladných, dobře větratelných a uzamykatelných skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, hořlavin, léků, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě +5 °C až +30 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Chraňte před slunečním zářením.

Likvidace obalů a zbytků:

Talkový obal: nepropichujte nebo nespálujte ani po použití.

Nepoužitý pomocný prostředek nebo prázdný obal se zbytky odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Zákaz opětovného použití obalu.

Další údaje a upřesnění:

Držitel rozhodnutí o povolení nepřebírá žádnou zodpovědnost za ztráty a škody způsobené nesprávným skladováním a použitím pomocného prostředku.

Riziko za poškození vyplývající z použití pomocného prostředku jinak než jak je uvedeno v této etiketě nese spotřebitel.

Pomocný prostředek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že jejich chemické a fyzikální vlastnosti se shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbor pomocného prostředku pro tento účel zajistí držitel povolení u laboratoře akreditované v členském státě Evropské unie. Držitel povolení je povinen prodlouženou dobu použitelnosti vyznačit na obalu pomocného prostředku a tuto skutečnost oznámit Ústavu do 5 dnů ode dne provedení změny na obalu pomocného prostředku.